RP-HPLC 法同时测定清肺化痰丸中 4 种成分

陆丽娜¹, 董加花², 左艳华², 师永清¹, 吴光云¹

(1. 西北民族大学化工学院, 甘肃省高校环境友好复合材料及生物质利用省级重点实验室, 甘肃 兰州 730030; 2. 青岛大学附属医院药剂科, 山东 青岛 266003)

摘要: 目的 建立 RP-HPLC 法同时测定清肺化痰丸(麻黄、苦杏仁、陈皮等)中 4 种成分的含有量。方法 清肺化痰丸甲醇提取液的分析采用 Agilent TC-C₁₈₍₂₎ 色谱柱(250 mm×4.6 mm, 5 μm); 流动相 0.2% 磷酸-乙腈, 梯度洗脱; 柱温 25 ℃; 体积流量 0.8 mL/min; 检测波长 207 nm (麻黄碱、苦杏仁苷)和 278 nm (橙皮苷、黄芩苷)。结果 麻黄碱、苦杏仁苷、橙皮苷和黄芩苷分别在 0.158~3.950、0.216~5.400、0.164~4.100、0.160~4.000 μg 范围内线性关系良好, 加样回收率(RSD)分别为 99.68% (1.90%)、99.27% (1.15%)、98.83% (1.31%)、98.70% (1.09%)。结论 该方法简便快速, 灵敏准确, 重复性好, 可用于清肺化痰丸的质量控制。

关键词: 清肺化痰丸; 麻黄碱; 苦杏仁苷; 橙皮苷; 黄芩苷; HPLC

中图分类号: R927.2

文献标志码: A

文章编号: 1001-1528(2016)09-1956-04

doi:10.3969/j.issn.1001-1528.2016.09.017

Simultaneous determination of four constituents in Qinfei Huatan Pills by RP-HPLC

LU Li-na¹, DONG Jia-hua², ZUO Yan-hua², SHI Yong-qing¹, WU Guang-yun¹

(1. School of Chemical Engineering, Northwest University for Nationalities; Key Laboratory for Utility of Environment-Friendly Composite Material and Biomass in Universities of Gansu Province, Lanzhou 730030, China; 2. Department of Pharmacy, the Affiliated Hospital of Qingdao University, Qingdao 266003, China)

ABSTRACT: **AIM** To establish an RP-HPLC method for the simultaneous determination of four constituents in Qinfei Huatan Pills (for resolving sputum due to lung conditions) (*Ephedrae Herba*, *Armeniacae Semen Amarum*, *Citri Reticulatae Pericarpium*, etc.). **METHODS** The analysis of Qinfei Huatan Pills methanolic extract was performed on a 25 ℃ thermostatic Agilent TC-C₁₈₍₂₎ column (250 mm×4.6 mm, 5 μm), with the mobile phase comprising of acetonitrile-0.2% phosphoric acid flowed at 0.8 mL/min in a gradient elution manner. And the detection wavelengths were set at 207 nm for ephedrine and laetrile, and 278 nm for hesperidin and baicalin. **RESULTS** Ephedrine, laetrile, hesperidin and baicalin showed good linear relationships within the ranges of 0.158–3.950 μg, 0.216–5.400 μg, 0.164–4.100 μg and 0.160–4.000 μg, whose recoveries were 99.68%, 99.27%, 98.83% and 98.70% with the RSDs of 1.90%, 1.15%, 1.15% and 1.09%, respectively. **CONCLUSION** This accurate, sensitive and well reproducible method is easily practicable for the rapid quality control of Qinfei Huatan Pills.

KEY WORDS: Qinfei Huatan Pills; ephedrine; laetrile; hesperidin; baicalin; HPLC

清肺化痰丸为中药复方制剂, 收载于《中华人民共和国卫生部药品标准(中药成方制剂)》第12册^[1], 制法为将麻黄、苦杏仁、陈皮、胆南星、黄芩、川贝母、桔梗、法半夏、枳壳、白苏子、瓜蒌子、莱菔子、款冬花、茯苓、甘草 15 味药材粉

碎成细粉, 加入辅料蜂蜜和适量水制成棕黑色水蜜丸, 主要用于肺热咳嗽、痰多气喘、痰涎壅盛、肺气不暢^[2-4]。其中, 麻黄碱为从麻黄属植物中提取得到的生物碱, 具有止咳、平喘、祛痰的功效^[5]; 苦杏仁苷为从苦杏仁中提取得到, 俗称维生素 B₁₇,

收稿日期: 2015-10-28

基金项目: 西北民族大学中央高校基本科研业务费专项资金重点项目(31920150016)

作者简介: 陆丽娜(1983—), 女, 硕士, 讲师, 从事中药分析与质量控制研究。Tel: 18089383587, E-mail: lulina1113@163.com

亦有降气、止咳、平喘的作用^[6]；橙皮苷为从陈皮中提取的双氢黄酮苷类活性成分，可对抗组胺引起的血管通透性增加^[7]；黄芩苷为从黄芩根中提取的黄酮类化合物，其生理效应为抑菌抗炎、利尿、解痉和较强的抗癌活性^[8]。目前，该制剂原标准中仅有常规项检查、显微鉴别和黄芩薄层色谱鉴别，无含有量测定内容，而文献^[9]采用HPLC法测定制剂中橙皮苷、黄芩苷、柚皮苷的含有量。参照文献^[10-12]，本实验建立HPLC法同时定量测定清肺化痰丸中麻黄碱、苦杏仁苷、橙皮苷和黄芩苷的含有量，为完善该制剂质量标准提供依据。

1 仪器与试剂

1.1 仪器 Agilent 1200 高效液相色谱仪，配备在线脱气机、四元泵、自动进样器、柱温箱和PDA检测器（美国Agilent公司）；Advanced-I-24L型超纯水机（成都艾柯水处理设备有限公司）；AS3120型超声波清洗器（奥特恩斯仪器有限公司）；FW135型中草药粉碎机（天津市泰斯特仪器有限公司）；AB204-S型电子分析天平（瑞士Mettler Toledo公司）。

1.2 试剂 麻黄碱（批号110749-200410）、苦杏仁苷（批号110749-200410）、橙皮苷（批号110736-200933）和黄芩苷（批号110715-201016）对照品均购自中国食品药品检定研究院。清肺化痰丸（6g/袋，昆明中药厂有限公司，批号140101、140143、140235）。乙腈、甲醇均为色谱纯（山东禹王实业有限公司化工分公司）；磷酸为分析纯（烟台市双双化工有限公司）；水为重蒸水。

2 方法与结果

2.1 色谱条件 Agilent TC-C₁₈₍₂₎ 色谱柱（250 mm × 4.6 mm，5 μm）；柱温 25 ℃；流动相 0.2% 磷酸水溶液（A）-乙腈（B），梯度洗脱（0 ~ 5 min，100% A；5 ~ 10 min，97% A；10 ~ 11 min，95% A；11 ~ 20 min，98% A；20 ~ 25 min，92% A；25 ~ 30 min，80% A；30 ~ 45 min，80% A；45 ~ 50 min，75% A）；体积流量 0.8 mL/min；检测波长 207 nm（麻黄碱、苦杏仁苷）和 278 nm（橙皮苷、黄芩苷）。

2.2 溶液的配制

2.2.1 对照品溶液 精密称取麻黄碱、苦杏仁苷、橙皮苷、黄芩苷对照品适量，甲醇制成 0.790 0、1.080 0、0.820 0、0.800 0 g/L 对照品贮备液，4 ℃ 下保存。吸取适量，甲醇配成 0.158 0、0.216 0、0.164 0、0.160 0 g/L 混合对照品溶液，4 ℃ 下保

存，备用。

2.2.2 供试品溶液 精密称取清肺化痰丸 2 g，置于研钵中充分研细，15 mL 甲醇定量转移至 50 mL 量瓶中，超声提取 20 min，过滤，滤渣加入 15 mL 甲醇，超声提取 20 min，过滤，剩余滤渣再用 15 mL 甲醇超声提取 20 min，收集 3 次滤液，冷却至室温，甲醇定容至 50 mL，0.45 μm 微孔滤膜过滤，取续滤液，4 ℃ 下冷藏备用。

2.2.3 阴性对照溶液 按本品处方和制法，制备缺麻黄、苦杏仁、陈皮、黄芩的阴性对照样品，按“2.2.2”项下方法制备阴性对照溶液，摇匀，过滤，取续滤液，4 ℃ 下冷藏备用。

2.3 系统适应性及专属性试验 精密吸取混合对照品溶液 6 μL、供试品溶液 10 μL、阴性对照溶液 10 μL，在“2.1”项色谱条件下测定。结果，各成分与相邻色谱峰的分离度均大于 1.5，对称因子均在 0.95 ~ 1.05 之间，理论塔板数以各成分色谱峰计均大于 20 000，其他组分不干扰 4 种成分的测定，方法专属性良好，见图 1。

2.4 线性关系考察 精密吸取“2.2.1”项下混合对照品溶液 1、3、6、9、12、15、20、25 μL，注入液相色谱仪，在“2.1”项色谱条件下测定，以峰面积为纵坐标（Y），进样量为横坐标（X）进行回归，得到麻黄碱、苦杏仁苷、橙皮苷和黄芩苷的回归方程分别为 $Y = 3\,001.6X - 80.029$ ($r = 0.999\,8$)、 $Y = 1\,039.6X - 21.673$ ($r = 0.999\,9$)、 $Y = 1\,495.1X - 36.154$ ($r = 0.999\,7$)、 $Y = 3\,367.7X - 21.080$ ($r = 0.999\,4$)，分别在 0.158 ~ 3.950、0.216 ~ 5.400、0.164 ~ 4.100、0.160 ~ 4.000 μg 范围内线性关系良好。

2.5 精密度试验 精密吸取“2.2.1”项下混合对照品溶液 6 μL，注入液相色谱仪，在“2.1”项色谱条件下连续进样 6 次，测得麻黄碱、苦杏仁苷、橙皮苷和黄芩苷峰面积 RSD 分别为 0.24%、1.29%、1.25%、1.20%，表明仪器精密度良好。

2.6 重复性试验 精密量取同一批清肺化痰丸（批号 140101）6 份，按“2.2.2”项下方法制备供试品溶液，在“2.1”项色谱条件下进样 10 μL 测定，测得麻黄碱、苦杏仁苷、橙皮苷和黄芩苷平均含有量分别为 0.428 3、1.334 8、7.911 5、4.688 9 mg/g，RSD 分别为 0.58%、2.99%、2.29%、2.91%，表明该方法重复性良好。

2.7 稳定性试验 精密称取清肺化痰丸样品（批号 140143）1 份，按“2.2.2”项下方法制备供试

1. 麻黄碱 2. 苦杏仁苷 3. 橙皮苷 4. 黄芩苷
1. ephedrine 2. laetrile 3. hesperidin 4. baicalin

图1 HPLC 色谱图

Fig. 1 HPLC chromatograms

品溶液, 于0、2、4、6、8、10 h在“2.1”项色谱条件下测定, 测得麻黄碱、苦杏仁苷、橙皮苷和黄芩苷峰面积 RSD 分别为 3.94%、4.03%、2.39% 和 3.20%。表明供试品溶液在 10 h 内稳定性良好。

2.8 加样回收率试验 精密称取含有量已知(麻黄碱 0.428 3 mg/g、苦杏仁苷 1.334 8 mg/g、橙皮苷 7.911 5 mg/g、黄芩苷 4.688 9 mg/g)的清肺化痰丸(批号 140101) 1 g, 平行 6 份, 置于研钵中, 精密加入各对照品溶液(0.158 g/L 麻黄碱 3 mL、0.216 g/L 苦杏仁苷 6 mL、0.820 g/L 橙皮苷 9 mL、0.800 g/L 黄芩苷 6 mL), 7.5 mL 甲醇定量转移至 50 mL 量瓶中, 超声提取 20 min, 过滤, 滤渣加入 7.5 mL 甲醇, 超声提取 20 min, 过滤, 滤渣再用 7.5 mL 甲醇超声提取 20 min, 收集 3 次滤液, 冷却至室温, 甲醇定容至 50 mL, 即得加样供试品溶液, 0.45 μm 微孔滤膜过滤。精密吸取 10 μL, 注入液相色谱仪, 在“2.1”项色谱条件下计算回收率, 结果见表 1。

表 1 加样回收率试验结果 (n=6)

Tab. 1 Results of recovery tests (n=6)

成分	称样量/ g	原有量/ mg	加入量/ mg	测得量/ mg	回收率/ %	平均回收 率/% (RSD/%)
麻黄碱	1.001 2	0.428 8	0.474 0	0.902 9	100.02	99.68
	1.002 3	0.429 3	0.474 0	0.913 3	102.11	(1.90)
	1.001 8	0.429 1	0.474 0	0.902 3	99.84	
	1.002 0	0.429 2	0.474 0	0.895 0	98.28	
	1.000 9	0.428 7	0.474 0	0.887 6	96.82	
	1.001 8	0.429 1	0.474 0	0.907 8	101.00	
苦杏仁苷	1.001 2	1.336 4	1.296 0	2.648 0	101.20	99.27
	1.002 3	1.337 9	1.296 0	2.628 0	99.55	(1.15)
	1.001 8	1.337 2	1.296 0	2.628 9	99.67	
	1.002 0	1.337 5	1.296 0	2.608 9	98.10	
	1.000 9	1.336 0	1.296 0	2.609 7	98.28	
	1.001 8	1.337 2	1.296 0	2.618 0	98.83	
橙皮苷	1.001 2	7.921 0	7.380 0	15.302 0	100.01	98.83
	1.002 3	7.929 7	7.380 0	15.290 3	99.74	(1.31)
	1.001 8	7.925 7	7.380 0	15.311 9	100.08	
	1.002 0	7.927 3	7.380 0	15.088 7	97.04	
	1.000 9	7.918 6	7.380 0	15.178 6	98.37	
	1.001 8	7.925 7	7.380 0	15.138 9	97.74	
黄芩苷	1.001 2	4.694 5	4.800 0	9.396 0	97.95	98.70
	1.002 3	4.699 7	4.800 0	9.496 7	99.94	(1.09)
	1.001 8	4.697 3	4.800 0	9.385 3	97.67	
	1.002 0	4.698 3	4.800 0	9.413 6	98.24	
	1.000 9	4.693 1	4.800 0	9.408 9	98.25	
	1.001 8	4.697 3	4.800 0	9.505 7	100.17	

2.9 样品含有量测定 精密称取 3 批清肺化痰丸适量, 每批 3 份, 按“2.2.2”项下方法制备供试

品溶液,在“2.1”项色谱条件下进样 10 μL 测定,计算含有量,结果见表 2。

表 2 含有量测定结果 ($n=3$)

Tab. 2 Results of content determination ($n=3$)

批号	麻黄碱/		苦杏仁苷/		橙皮苷/		黄芩苷/	
	($\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$)	%						
140101	0.428 3	0.58	1.334 8	2.99	7.911 5	2.29	4.688 9	2.91
140143	0.504 1	1.29	1.458 4	2.26	8.836 3	1.04	4.183 3	1.36
140235	0.419 0	0.86	1.401 2	0.79	7.514 0	0.66	4.500 2	0.97

3 讨论

3.1 检测波长的确定 采用 PDA 检测器检测对照品和供试品,发现麻黄碱的最大吸收波长在 207 nm 处,苦杏仁苷在 195 nm 和 245 nm 处,橙皮苷在 275 nm 处,黄芩苷在 278 nm 处,而且苦杏仁苷在 207 nm、橙皮苷在 278 nm 处亦有较强吸收,而且干扰峰较少。综合以上因素,确定检测波长为 207 nm (麻黄碱和苦杏仁苷) 和 278 nm (橙皮苷和黄芩苷)。

3.2 提取方法的选择 本实验先用浸渍法,精密称取样品 0.700 0 g,置于研钵中研成细小粉末,甲醇定量转移至 25 mL 量瓶中,超声提取 30 min,定容,上清液用微孔滤膜过滤,制得样品溶液,但发现该方法提取率较低,达不到含有量测定的要求。再使用甲醇加热回流法提取,提取时间 1 h,提取液减压蒸干,甲醇定容,提取效果较好,但操作繁琐,对提取率稳定性影响较大。最终,将清肺化痰丸置于研钵中研细,精密称取适量,置于 50 mL 量瓶中,15 mL 甲醇超声提取 20 min,过滤,再重复操作两次,弃去滤渣,收集 3 次滤液,甲醇定容至 50 mL,制得样品溶液,该方法提取效果较好,提取时间 1 h,操作简单方便,可满足清肺化痰丸含有量测定的要求。

3.3 流动相的选择 考察乙腈、水、0.2% 磷酸水溶液和甲醇对混合对照品中 4 种成分的分离和出峰情况,发现乙腈洗脱能力最强,相对保留时间较短;甲醇洗脱能力较弱,相对保留时间比乙腈长;

以水为流动相时,相对保留时间最长;选择水-乙腈作为流动相时,乙腈比例越高,洗脱能力越强;当流动相改为 0.2% 磷酸水溶液-乙腈时,峰的拖尾情况得到改善,但比例过高会导致各成分相对保留时间过短,不符合分离度要求。最终,通过梯度洗脱法使得各成分先后洗脱,未见其他成分干扰。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国卫生部药典委员会. 中华人民共和国卫生部药品标准(中药成方制剂): 第 12 册[S]. 北京: 人民卫生出版社, 1996: 176.
- [2] 孙蓉, 田婷婷, 钱进. 清肺化痰丸的质量标准研究[J]. 中国民族民间医药, 2014, 23(13): 16-18.
- [3] 杨莉丽, 罗永静, 吝伟, 等. 红外光谱法结合化学计量学对小儿咳喘类药物的定性鉴别研究[J]. 中成药, 2012, 34(3): 517-520.
- [4] 朱艳琴, 殷勤红. 高效液相色谱法测定清肺化痰丸中苦杏仁苷的含量[J]. 光谱实验室, 2012, 27(1): 264-267.
- [5] 苏丹, 宋永贵, 魏斌斌, 等. RRLC 法快速测定克咳胶囊中盐酸麻黄碱、盐酸伪麻黄碱和吗啡[J]. 中成药, 2013, 35(11): 2407-2410.
- [6] 张伟, 林彤, 江英桥. RRLC 法同时测定橘红痰咳颗粒中苦杏仁苷和柚皮苷[J]. 中成药, 2012, 34(5): 865-868.
- [7] 张冬松, 高慧媛, 吴立军. 橙皮苷的药理活性研究进展[J]. 中国现代中药, 2006, 8(7): 25-27.
- [8] 云云, 汪长中, 桂丽, 等. 黄芩苷经由 TLR4 信号转导通路抗呼吸合胞病毒作用的研究[J]. 中成药, 2013, 35(6): 1116-1120.
- [9] 朱艳琴, 王文辉, 杨俊. RP-HPLC 同时测定清肺化痰丸中 3 种成分含量[J]. 中成药, 2009, 31(11): 1705-1707.
- [10] 宋剑锋, 冯敬骞, 胡建华, 等. HPLC 法同时测定常山胡柚花中柚皮苷、橙皮苷和新橙皮苷的量[J]. 中草药, 2014, 45(6): 854-856.
- [11] 师永清, 康淑荷, 王爱军. HPLC 法同时测定导赤丸中栀子苷、芍药苷、黄芩苷和盐酸小檗碱[J]. 中成药, 2013, 35(7): 1462-1465.
- [12] 夏卉莉, 刘力, 倪嘉纳. HPLC 法同时测定红藤颗粒中苦杏仁苷、香蒲新苷及异鼠李素-3-O-新橙皮苷[J]. 中成药, 2013, 35(3): 525-528.